


Enfermedades de transmisión sexual



I. Escucha con atención:



SÍFILIS

Es una enfermedad infecto-contagiosa de transmisión sexual producida por una bacteria que puede afectar cualquier tejido u órgano vascular .

Es una llaga (chancro) parecida a un granito o herida que no duele , ni pica , ni sangra . Se localiza en los genitales del hombre y de la mujer , aparece de 2 a 5 semanas después de haber tenido relaciones sexuales con una persona infectada .

Esta enfermedad (sífilis) si no se trata , puede llevar a la locura y a la muerte .

GONORREA

Es una enfermedad infecto-contagiosa de transmisión sexual producida por una bacteria .



En el varón

Tiene calentura o fiebre, ardor al orinar y bota gotitas de pus , después de meses o años se presenta reumatismo .

En la mujer

Al principio no hay señales , pero después de unos meses o años , se presenta una inflamación en el vientre , hay problemas de menstruación , puede contagiar al recién nacido y finalmente , produce infertilidad (no puede tener hijos) .

Se recomienda :

- Evitar el contacto con personas de las que se sospecha que están infectadas
- Usar preservativo (condón) en cada relación sexual .
- El enfermo debe ir al centro de salud .
- El tratamiento debe darse en pareja .

SÍNDROME DE INMUNO DEFICIENCIA ADQUIRIDA (SIDA)

Es una enfermedad que destruye el sistema inmunológico de la persona (sistema de protección contra las enfermedades) dejándola así vulnerable a cualquier enfermedad (infecciones o cánceres)

Esta enfermedad es producida por el virus de **inmuno deficiencia humana (VIH)**



II. Marca V si es verdadero o F si es falso.

- a) La sífilis puede causar locura y la gonorrea, esterilidad .
- b) El SIDA debilita al cuerpo y lo hace vulnerable ante cualquier enfermedad .

V F

V F

Al comienzo la persona infectada por el virus no siente nada pero , tiene el virus en su sangre y puede contagiar a otras personas sin saberlo .

Existen tres vías de contagio y son :

Vía sexual

Se produce por las relaciones sexuales con personas infectadas .
Puede transmitirse de hombre a mujer , de hombre a hombre , de mujer a mujer y de mujer a hombre .

Vía sanguínea

Se produce por transfusiones de sangre infectada , uso de agujas ,
hojas de afeitar , objetos punzantes infectados .

Vía perinatal

De la madre al feto , antes del parto o durante el parto .

Recuerda

El SIDA **NO** se transmite por caricias y besos , al dar la mano , a través de las lágrimas , ni en los lugares públicos .

¿ Cómo se reconoce esta enfermedad ?

Fuerte diarrea y de larga duración .

Pérdida de peso (5 kilos) rápidamente .

Fiebre y sudor de noche durante varias semanas .

Hinchazón de los ganglios del cuello , de las axilas y de las ingles .

Mucho cansancio permanentemente , aún estando en reposo .

Manchas de color rojizo en la piel y hongos en la boca .



III . Marca la afirmación correcta.

- Las tres formas de contagio son : por relaciones sexuales con infectados (as) , por transfusiones de sangre y por vía perinatal .
- El SIDA también se transmite por besos , caricias y al dar la mano .


Existe un examen de sangre que se llama **ELISA** para detectar a las personas que tienen el virus VIH .

La persona cuyo examen de ELISA arrojó positivo , se le llama seropositiva (o)

Esto quiere decir que es portadora (or) del virus , no tiene problemas de salud , pero puede contagiar a otras personas .

Se recomienda

- La fidelidad . Tener una única pareja .
- Compartir información adecuada sobre la prevención del SIDA .
- Usar el preservativo (condón) adecuadamente , como un medio de protección .



Hazlo TÚ mismo

AVERIGUA Y COMPARTE TU RESPUESTA

1.¿ Qué más conoces sobre el SIDA ?