


# Medicamentos esenciales



## I. Escucha con atención:



**Lista sugerida para un botiquín**

Nombres genéricos	Nombres comerciales
1. Ácido acetil salicílico	( aspirina , assart , ascriptín , rhonal )
2. Benzoato de bencilo	( acaril )
3. Clorfeniramina	( clorotrimetón , rynatán )
4. Clotrimazol	( canestén , lotramina , baycutén )
5. Cotrimoxazol	( bactrim , septrín , mebryn )

## ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO ( aspirina , asart , ascriptín , rhonal )

### ¿Cuáles son sus usos ?

Baja la fiebre , calma el dolor , disminuye la inflamación .

### ¿Cuál es la dosis ?

Para mayores de doce ( 12 ) años se le puede dar una ( 1 ) tableta , máximo cuatro ( 4 ) veces al día .

### Importante

Puede producir ardor en la boca del estómago y náuseas .

No deben tomar este medicamento las personas con úlceras o gastritis .

No deben tomar este medicamento niños menores de doce (12) años .

No deben tomar este medicamento las gestantes , ni las madres que dan de lactar .





MEÑORES DE 12 AÑOS



LACTANTES Y GESTANTES

### Recuerda

Sólo se debe tomar por tres días , como máximo . Además , se tiene que tomar el medicamento junto con los alimentos .

### Benzoato de bencilo ( acaril )

#### ¿Cuáles son sus usos ?

Sirve para combatir la acarosis ( rasca rasca ) .

#### ¿Cuál es la dosis ?

Se aplica la loción en todo el cuerpo , menos en la cara .

#### Importante

Puede producir irritación en la piel y puede provocar convulsiones .


Si ocurre cualquiera de estas dos situaciones , se debe suspender el tratamiento , bañar al enfermo para quitarle el medicamento y llevarlo al centro de salud .

#### Recuerda

Lavar y hervir la ropa todos los días .

Se debe dejar soleando el mayor tiempo posible el conchón , las sábanas , frazadas , todo lo que es ropa de cama .

Si este tratamiento no cura en cinco ( 5 ) días lleva al paciente al centro médico .



#### II. Marca V si es verdadero o F si es falso.

a) La dosis es la cantidad de medicina que se da a un paciente .

(V) (F)

b) El ácido acetil salicílico , no puede producir malestares .

(V) (F)

c) El benzoato de bencilo se aplica en todo el cuerpo , pero no en la cara .

(V) (F)

**Este tratamiento debe realizarse durante cinco días seguidos .**

**¿ Cómo se aplica esta medicina ?**

1º Se debe bañar en la noche y secarse bien .

2º Aplicarse la loción o la crema , por todo el cuerpo .

3º Al día siguiente , bañarse por la mañana para sacar la loción o crema y ponerse ropa limpia .



### **Clorfeniramina ( clorotrimetón , rynatán )**

**¿Cuáles son sus usos ?**

Se usa en alergias o ronchas .

**¿Cuál es la dosis ?**

En mayores de 12 años : 1 tableta , máximo 4 veces al día y en los niños de 6 a 12 años , media (  $\frac{1}{2}$  ) tableta , máximo 4 veces al día .

**Este tratamiento dura sólo hasta que las molestias desaparezcan .**

**Importante**

Evitar dar a niños menores de 6 años , gestantes y madres que dan de lactar .

En el caso de los niños , pueden producir alucinaciones y convulsiones .

En el caso de los mayores , mientras se esté con este tratamiento , no se debe tomar bebidas alcohólicas .

Tener cuidado quienes trabajan con máquinas , porque produce sueño .



### **III . Marca las afirmaciones correctas.**

- a) El benzoato de bencilo , viene en loción o en crema y la clorfeniramina viene en tabletas .
- b) El tratamiento con benzoato de bencilo , se debe hacer durante tres días seguidos .
- c) La clorfeniramina , no se debe dar a niños menores de seis ( 6 ) años .

## Clotrimazol ( canestén , lotramina , baycutén )

### ¿Cuáles son sus usos ?

Se usa para tratar hongos o manchas de la piel .

### ¿Cuál es la dosis ?

Aplicar la solución o crema en la zona afectada 2 veces al día .

**Este tratamiento se debe continuar aplicando quince días ( 15 ) después que desaparezcan las manchas .**

### Importante

Antes de aplicar esta medicina , debes secar la piel cuidadosamente , especialmente la parte afectada .

Si ves que hay signos de infección , entonces , es necesario ayuda médica .



**Hazlo TÚ mismo**

### PIENSA Y RESPONDE

#### Marca las recomendaciones correctas.

1º el clotrimazol , se puede usar para las alergias .

2º el clotrimazol , se usa contra los hongos .

3º el clotrimazol , se usa quince días más después que ya no hay molestias .