


Animales menores

(III PARTE)



I. Escucha con atención:



CUIDADOS EN LA PREÑEZ (gestación)


La cerda es multípara , lo que quiere decir que produce muchas crías durante el parto .

Si después de haber sido montada la cerda por el padrillo y si pasados 25 días , no se nota que la cerda está en celo , podemos pensar que ha comenzado la preñez o gestación .

La preñez en la cerda , tiene una duración aproximada de 114 días .
Recuerda ésto : 3 - 3 - 3 (meses , semanas y días)



Durante el primer mes , después de montada y preñada la cerda , se le debe alimentar con uno o dos kilos de concentrado para evitar la muerte de los lechones .



No es conveniente mantener a la cerda preñada en terrenos fangosos (charcos de barro) o que sean muy inclinados , hay que evitar caídas y golpes que pueden causar el aborto .

Tampoco se debe dejar a la cerda preñada en compañía del padrillo , porque la puede golpear causando el aborto .

Anota en un cuaderno la fecha en que fue montada la cerda y la posible fecha del parto .

Los residuos de la cosecha , se deben dar lavados . Por ejemplo , el maíz , se debe remojar desde el día anterior en agua con sal para ablandarlo y así sea más fácil de digerir .



II . Marca V si es verdadero o F si es falso .

- a) La preñez en la cerda dura tres meses , tres días y tres horas . V F
- b) Si la cerda sufre caídas o golpes puede abortar . V F
- c) Es peligroso dejar a la cerda preñada , en compañía del padrillo . V F
- d) La preñez en la cerda dura tres meses , tres semanas y tres días . V F

El bebedero debe estar siempre lleno de agua fresca , ésto es importante para las cerdas preñadas .

IMPORTANTE

Uno o dos días antes del parto , se debe desinfectar el chiquero y bañar a la cerda con agua y jabón ,principalmente en la parte trasera de los pezones .



El día del parto , no se debe dar alimentos sólidos (duros) a la cerda . Su único alimento debe ser bastante agua limpia.

El parto normal dura de 1 a 6 horas y cada lechón demora en nacer 1 y 15 minutos. Los últimos lechones son los que demoran más tiempo en nacer .

Es conveniente estar presente a la hora del parto , para ayudar a la cerda en los momentos difíciles .

Se debe limpiar la cabeza y la nariz del lechón , para evitar que muera asfixiado (ahogado) por causa de los mocos y membranas que lo cubren .



III. Marca la alternativa correcta .

- a) Se tiene que bañar a la cerda preñada días antes del parto .
- b) El baño de la cerda preñada sólo debe ser con agua fresca .
- c) El día del parto se tiene que dar alimentos sólidos a la cerda para que se recupere .

RECUERDA

- ▶ A los lechones se les corta los colmillos con unas tijeras o cortauñas para que no hagan heridas en las tetas de la madre .

- ▶ Cuando la cerda expulsa la placenta , se la bota para que no se la coma .
- ▶ La vacuna contra la peste porcina se debe aplicar a los 45 días de nacido.
- ▶ El destete de los lechones se empieza a los 50 días de nacidos , primero se destetan a los lechones más fuertes y grandes , ocho (8) días después , los lechones más débiles y pequeños .
- ▶ En los comederos no se deben dejar residuos de varios días , porque se pudren y causan intoxicaciones y diarreas .
- ▶ El cerdo que más gusta para llevar al matadero , es el que pesa entre 100 y 120 kilogramos .
- ▶ La carne de cerdo medio asada o mal cocinada , puede enfermarte con la *lombriz solitaria* , llamada también *tenia* (cisticercosis)



Hazlo TÚ mismo



AVERIGUA Y COMPARTE TU RESPUESTA .

¿ Qué es la **TRIQUINOSIS** y cómo se previene ?